

Laboratoire d'analyses médicales Dr. Luc Salamin

Avenue du Rothorn 10, 3960 Sierre

Tél. 027 451 24 51

Fax 027 451 24 56

Examen prénatal: dépistage des risques

☐ Sérum ☐ Sérum réfrigéré ☐ Sérum congelé Pour le 1 ^{er} trimestre, centrifuger le sang après coagulation (20 min), décanter le sérum, le maintenir à 4-8°C jusqu'à 12 heures, au-delà congeler. Date du prélèvement :/	
Anamnèse – Renseignements cliniques - Antécédents	
Date des dernières règles :	on assistée
Informations sur l'échographie	
Echographie faite le*:/	
1TT − Test de dépistage de 1 ^{er} trimestre Test du 1 ^{er} trimestre : Prélèvement entre la 11è ^{me} et 13è ^{me} semaine + 6 jours. Analyse du risque de trisomie 21, 18 et 13 au moment du prélèvement (PAPP-A, Beta-hCG libre)	
Longueur cranio-caudale (LCC) *:mm Si gémellarité, LCC (Jumeau 2) *:mm	ım
Clarté nucale (CN) *:mm Si gémellarité, CN (Jumeau 2) *:mm	
2TT – Test de dépistage de 2ème trimestre Test du 2ème trimestre : Prélèvement entre la 14ème et 18ème semaine + 6 jours. Analyse du risque de non fermeture du tube neural au moment du prélèvement (AFP). Diamètre bipariétal (BIP) * :mm Si gémellarité, BIP (Jumeau 2) * :mm	ım
2TTplus – Test de dépistage de 2 ème trimestre □ Test du 2ème trimestre : Prélèvement entre la 14ème et 18ème semaine + 6 jours. Analyse du risque trisomie 21 au moment du prélèvement (AFP, Beta-hCG libre).	
Lieu, date et signature du médecin :	



^{*} Données obligatoires